



Instrucciones para Colonoscopia

(401) 793-7080

Por favor traiga una identificación con fotografía

Debido a que puede haber emergencias inesperadas, no se puede garantizar la hora de su procedimiento. Comuníquese con su seguro médico antes de su procedimiento para conocer la cobertura de su plan en relación con el copago, el deducible, etc. (Esta es una unidad de endoscopia hospitalaria).

Preséntese para su procedimiento a la ubicación marcada con un círculo:

- Wayland Surgical Center, 17 Seekonk Street, Providence, RI
- 1º Piso, Unidad de Endoscopia, Miriam Hospital, 164 Summit Avenue, Providence, RI
- 9º Piso, Main Building, Rhode Island Hospital/9B Unidad de Endoscopia, 593 Eddy Street, Providence, RI

Fecha: _____ Hora de la cita: _____ Hora de llegada: _____

Importante

- **No deje de aspirina a menos que su medico. Si usted toma pastillas anticonceptivas por la noche, tome su pastille por la mañana el día del preparatorio o use otro método anticonceptivo si la tomas en la noche porque el preparatorio puede interferir con la absorción de la pastilla anticonceptiva.**
- **Un adulto responsable debe estar disponible para entrar en la sala de endoscopia para firmar para que usted abandone la unidad. Recuerde que debe tener a alguien que le lleve o que esté disponible para llevarle a su casa el día del procedimiento. Puede tomar un taxi o el autobús si está acompañado por un adulto responsable. No podrá manejar durante 24 horas después del procedimiento.**
- **Por favor de no usar perfume o lociones el día del examen.**

Importante: Notifique a su médico si está tomando medicamentos **para la diabetes (orales o inyectados) y/o anticoagulantes** (“para diluir la sangre”) como Coumadin, Heparin, Plavix, Warfarin, etc. y pida más instrucciones.

UN DÍA COMPLETO ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

¡SÓLO LÍQUIDOS CLAROS/NO ALIMENTOS SÓLIDOS, NO LÁCTEOS NI COLORANTES ROJOS!

Ejemplos de los líquidos claros que puede tomar el día anterior:

- ✓ Café regular o descafeinado (SIN CREMA o LECHE), puede usar azúcar o edulcorantes artificiales
- ✓ Jugos de frutas colados sin pulpa
- ✓ Caldo de sopa
- ✓ Ginger Ale, Sprite y 7 UP
- ✓ Bebidas deportivas (por ejemplo, Gatorade, Propel Water y Smart Water)
- ✓ Gelatina sin sabor, sin frutas ni otros ingredientes (evite los colores rojo, azul y púrpura)
- ✓ Helados de agua (evite los colores rojo, azul y púrpura)

EL DIA ANTES DEL COLONOSCOPIA Usted puede comer un desayuno ligero que consiste en rebanadas de pan tostado y líquidos claros.

Empiece a tomar Colyte/Nulytely a las 3:00p.m. de la tarde. Beba una taza cada 15-20 minutos. Hasta que se lo termine todo.

Después de tomar Colyte/Nulytely tome solamente líquidos claros.

Nota: Una vez que haya completado el procedimiento anterior, puede continuar con líquidos claros hasta cuatro (4) horas antes de su procedimiento programado.

El día del procedimiento:

Debe interrumpir todos los líquidos claros cuatro (4) horas antes de su procedimiento, a menos que el médico le indique otra cosa. Los medicamentos se pueden tomar de manera regular hasta cuatro (4) horas antes de su procedimiento.

EN EL DIA DE SU PROCEDIMIENTO Y TODAS FUTURAS CITAS TRAE POR FAVOR UNA LISTA COMPLETA DE SUS MEDICINAS Y DOSIS INCLUYENDO MEDICAMENTOS SIN RECETA Y SUPLEMENTARIO MEDICAMENTOS.